

素早く枯らし、長く抑える。

しつこい雑草に!!

非選択性茎葉処理除草剤

ザクザク

液剤

ラベルを一新!!





- スギナ、ツユクサなど、ほとんどの雑草を枯らします。
- 早く枯らし、長く雑草の発生を抑えます。
- 有効成分のグルホシネートPは土壌中で速やかに分解されます。

■適用雑草と使用方法

有効成分：グルホシネートPナトリウム塩・・・11.5% 人畜毒性：普通毒(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 (mL/10a) *1	使用回数 *2	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 (mL/10a) *1	使用回数 *2
果樹類 (かんきつ、りんご、 びわ、いちじく(種子)、 くり、キウイフルーツ、 食用桑(果実)、 さんしょう(果実)を除く)	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	300~500	3回以内	かんしょ	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	300~500	2回以内
	多年生雑草		500~1000				雑草生育期 萌芽前処理	100~200	1回
かんきつ りんご びわ キウイフルーツ	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	300~500	3回以内	ばれいしよ	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内
	多年生雑草		500~1000				収穫28日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	300~500	3回以内
いちじく(種子)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	300~500	3回以内	豆類 (種実、ただし らっかせいを除く)	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	300~500	3回以内
	多年生雑草		500~1000				収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	300~500	3回以内
くり	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	300~500	2回以内	えだまめ	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	300~500	2回以内
	多年生雑草		500~1000				は種前(雑草生育期)	300~500	3回以内
食用桑(果実)	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前)	300~500	3回以内	そば	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内
	多年生雑草		500~1000				定植前 (雑草生育期)	300~500	3回以内
さんしょう(果実)	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	300~500	2回以内	ほうれんそう	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内
	多年生雑草		500~1000				定植前 (雑草生育期)	300~500	3回以内
キャベツ	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500	3回以内	とうがん	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内
							収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500	2回以内
きゅうり なす ピーマン トマト ミニトマト とうがらし類	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500	2回以内	しそ	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内
							収穫14日前まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	300~500	2回以内
ねぎ すいか ブロッコリー	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500	2回以内	みょうが(花穂)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内
							みょうが(花穂)の 収穫14日前までただし、 花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	300~500	2回以内
メロン レタス 非結球レタス	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	かのごそう	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内
							収穫90日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内
にんじん	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内	水田作物	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	500~1000	2回以内
							萌芽前(雑草生育期)	500~1000	2回以内
ぎぼうし	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	水田作物 (水田刈跡) *4	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	500~1000	2回以内
							雑草生育期 (草丈30cm以下)	500~1000	2回以内
ごぼう	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	2回以内	水田作物 (水田畦畔) *4	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期 畦間・株間処理	300	2回以内
							雑草生育期 畦間・株間処理	300	2回以内
アスパラガス	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	収穫前日まで (雑草生育期 雑草生育期)	500	2回以内	茶(幼木)	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	300~500	3回以内
							雑草生育期 雑草生育期	300~500	3回以内
たまねぎ	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	茶	一年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
							雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
さといも(葉柄)	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	ホップ	一年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
							雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
さといも	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	たばこ	一年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
							雑草生育期 雑草生育期	200~500	1回
やまのいも	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	300~500	3回以内	花き類・観葉植物	一年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	300~500	3回以内
							雑草生育期 雑草生育期	300~500	3回以内
	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 雑草生育期)	500~1000	3回以内	樹木類	一年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	500~1000	3回以内
							雑草生育期 (草丈30cm以下)	500~1000	3回以内
	多年生雑草	雑草生育期 雑草生育期	1000~2000	3回以内	樹木等 *4	多年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	1000~2000	3回以内
							雑草生育期 (草丈30cm以下)	1000~2000	3回以内

*1：希釈水量10アール当たり100~150ℓを雑草茎葉散布してください。茶(幼木)は、100ℓを雑草茎葉散布してください。樹木等は、植栽地を除く樹木等の周辺地に100~200ℓを雑草茎葉散布してください。
 *2：本剤、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数を示します。 *3：ばれいしよでのグルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数は、3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)です。 *4：水田作物(水田刈跡)の適用場所は水田刈跡です。水田作物(水田畦畔)の適用場所は水田畦畔です。樹木等の適用場所は公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等です。

■使用上の注意事項

- △ 効果・薬害等の注意**
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
 - 散布直後の降雨は効果を減らすので、天候をよく見きわめてから散布してください。
 - 雑草の生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣りますので時期を失しないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布してください。
 - 植物に薬液が付着すると薬害を生じますので、散布液が付着の農作物、樹木の茎葉に飛散ないように散布してください。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にからないように十分注意して散布してください。
 - 茶(幼木)に使用するときは樹高30cm以上、雑草の草丈20cm以下で処理してください。処理当年には摘採しないでください。薬液が付着した茶葉には黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがあるので、噴口を低くして芽や新葉にからないように注意して散布してください。
 - アスパラガスの立茎栽培で使用する場合は、萌芽している若葉に薬害を生じるおそれがあるので、散布後新たに萌芽した若葉を用いて立茎してください。
 - 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはからないようにしてください。
 - 散布液を調製した容器及び散布器具は使用後十分に洗ってください。
- △ 安全使用上の注意**
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
 - 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
 - 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。(刺激性)
 - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
 - 養魚田周辺での使用には注意してください。(魚類)

● 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所に置かないでください。● 使用後の空容器は園場や用水路などに放置せず、適切に処理してください。

お問い合わせ/ご注文は

meiji Meiji Seika ファルマ株式会社
 東京都中央区京橋 2-4-16
<http://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

